

CAOS XT

CARACTERÍSTICAS

CAOS XT bajo la tecnología XT es una formulación de calcio 100% asimilable y biodisponible para los cultivos que previene y corrige las posibles deficiencias y fisiopatías de calcio en todo tipo de cultivos. La tecnología XT forma una estructura en forma de pinza que garantiza la unión de calcio, boro y aminoácidos para su correcta absorción tanto vía radicular como foliar.

Posteriormente, la tecnología XT se libera y el Boro complejado con etanolamina y los Aminoácidos libres provocan que el calcio presente en el producto sea absorbido y transportado por toda la planta, incluso a las partes superiores de la misma, cosa que no sería posible en el caso de un producto sólo con calcio.

CAOS XT consigue un excelente desarrollo de las raíces, ramas, brotes y frutos, y en general de cualquier órgano en crecimiento. Además, está especialmente indicado para su aplicación vía radicular y foliar.

COMPOSICIÓN	p/p	p/v
Nitrógeno (N) Total	0.4%	0.5%
Nitrógeno (N) Orgánico	0.4%	0.5%
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	15.0%	20.4%
Óxido de Calcio (CoO) Complejado por lignosulfonato sódico	15.0%	20.4%
Boro (B) soluble en agua	0.7%	0.9%
Boro (B) complejado por etanolamina	0.7%	0.9%
Aminoácidos libres	2.3%	3.1%

AMINOGRAMA

Alanina 0,8 %p/P – 1,1 % p/v	Cisteína 0,7 %p/p – 0,9 % p/v	Aspártico 0,8 %p/p – 1,1 % p/v
--	---	--

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- **Aspecto:** Líquido color marrón
- **pH:** 3 – 5
- **Densidad:** 1,34 – 1,38 g/cc

CAOS XT

DOSIS/ FORMA DE APLICACIÓN

APLICACIÓN	DOSIS
Foliar	100 – 300 cc/hl
Riego	3 – 6 L/ha

CULTIVO	APLICACIONES
Hortalizas	Realizar aplicaciones continuadas cada 7-14 días desde prefloración hasta el fin del ciclo.
Arándanos, Frutillas Otros Berries	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Uva de mesa y Uva Vinífera	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Nogales, Almendros, Avellanos	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Manzanos y Pomáceas	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Cerezos, Duraznos, Nectarines, otros Carozos	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Cítricos y Paltos	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.
Kiwi	Realizar al menos 4 aplicaciones: brotación, prefloración, cuajado y llenado de frutos.